



Acetaminophen (Tylenol o Panadol) Tabla de dosis

Uso: Para tratar dolor y fiebre

Definición de fiebre: Temperatura mayor de 100.4F o 38C

Cómo usar la tabla: busque el peso del niño en la parte de arriba de la tabla. Busque la dosis basado en el producto que tiene en sus manos. Puede mirar la cantidad a darle el mililitros (mL), en cucharaditas (tsp) o en tabletas (tabs)

Child's weight (pounds)	6-11	12-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60-71	72-95	96+	lbs.
Liquid 160 mg/5 milliliters (mL)	1.25	2.5	3.75	5	7.5	10	12.5	15	20	mL
Liquid 160 mg/1 teaspoon (tsp)	--	½	¾	1	1 ½	2	2 ½	3	4	tsp
Chewable 80 mg tablets	--	--	1 ½	2	3	4	5	6	8	tabs
Chewable 160 mg tablets	--	--	--	1	1 ½	2	2 ½	3	4	tabs
Adult 325 mg tablets	--	--	--	--	--	1	1	1 ½	2	tabs
Adult 500 mg tablets	--	--	--	--	--	--	--	1	1	tab

Límite de edad: No darle Tylenol a niños menores de 12 semanas (3 meses) a menos que su doctor(a) se lo indique. La razón es porque la fiebre en niños de 12 semanas de edad debe ser evaluada por un profesional de la salud lo antes posible. Si su bebé tiene fiebre, este debe ser examinado (a) por un médico ya. Excepción: si el bebé tiene 2 meses de edad, recibió sus primeras vacunas y le da fiebre en las primeras 24 horas después de las vacunas, entonces puede darle Tylenol o Panadol según su peso. Si el niño(a) tiene menos de 6 años de edad, NO mezcle más de un medicamento ya que varios medicamentos tienen Acetaminophen dentro y puede darle una sobredosis.

Atención: Siempre lea las etiquetas de otras medicinas que vaya a darle a su niño (a) ya que pueden tener acetaminophen. NUNCA dé Aspirina a un niño (a). Esto puede ser fatal.

Mida la dosis: La botella puede que traiga un gotero, una jeringuilla o un vasito para medir. Los goteros y jeringuillas son más exactos y seguros. Si no tiene jeringuilla, puede comprar una en la farmacia y pedirle al farmacéutico que la enseñe a usarla. Trate de no usar cucharas de la casa. Mejor compre una de medir. Recuerde que 1 cucharadita (tsp) son 5mL y ½ cucharadita son 2.5mL.

Cada cuánto: Puede darlo cada 4-6 horas cuando sea necesario. No lo dé más de 5 veces al día.

Supositorios: vienen en 80, 120, 325 y 650. La dosis rectal es la misma que la dosis por boca.

Website Source: SLCH <https://www.stlouischildrens.org/health-resources/dosage-tables/acetaminophen-tylenol-dosage-table>