



Ibuprofen (Advil o Motrin) Tabla de dosis

Uso: Para tratar dolor y fiebre

Definición de fiebre: Temperatura mayor de 100.4F o 38C

Cómo usar la tabla: busque el peso del niño en la parte de arriba de la tabla. Busque la dosis basado en el producto que tiene en sus manos. Puede mirar la cantidad a darle el mililitros (mL), en cucharaditas (tsp) o en tabletas (tabs)

Child's weight (pounds)	12-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60-71	72-95	96+	lbs.
Infant Drops 50 mg/1.25 mL	1.25	1.875	2.5	3.75	5	--	--	--	mL
Liquid 100 mg/5 milliliters (mL)	2.5	4	5	7.5	10	12.5	15	20	mL
Liquid 100 mg/1 teaspoon (tsp)	½	¾	1	1 ½	2	2 ½	3	4	tsp
Chewable 100 mg tablets	--	--	1	1 ½	2	2 ½	3	4	tabs
Junior-strength 100 mg tablets	--	--	--	--	2	2 ½	3	4	tabs
Adult 200 mg tablets	--	--	--	--	1	1	1 ½	2	tabs

Límite de edad: No utilizar en niños menores de 6 meses de edad. La FDA no la ha aprobado para esas edad ya que no se sabe cuán segura sea. Si tiene menos de 6 años de edad, no dar productos que tengan más de un ingrediente (recomendación del FDA, 2008)

Atención: Siempre lea las etiquetas de otras medicinas que vaya a darle a su niño (a) ya que pueden tener Ibuprofén. NUNCA dé Aspirina a un niño (a). Esto puede ser fatal.

Mida la dosis: La botella puede que traiga un gotero, una jeringuilla o un vasito para medir. Los goteros y jeringuillas son más exactos y seguros. Si no tiene jeringuilla, puede comprar una en la farmacia y pedirle al farmacéutico que la enseñe a usarla. Trate de no usar cucharas de la casa. Mejor compre una de medir. Recuerde que 1 cucharadita (tsp) son 5mL y ½ cucharadita son 2.5mL.

Cada cuánto: Puede darlo cada 6-8 horas cuando sea necesario. No lo dé más de 5 veces al día.

Website Source: SLCH <https://www.stlouischildrens.org/health-resources/dosage-tables/ibuprofen-motrin-advil-dosage-table>