



Benadryl

Tabla de dosis

Indicación de uso: Para el tratamiento de reacciones alérgicas, alergias nasales, picor y ronchas.

Cómo usar la tabla: busque el peso del niño en la parte de arriba de la tabla. Busque la dosis basado en el producto que tiene en sus manos. Puede mirar la cantidad a darle en mililitros (mL), en cucharaditas (tsp) o en tabletas (tabs)

Child's weight (pounds)	20-24	25-37	38-49	50-99	100+	lbs.
Liquid 12.5 mg/5 milliliters (mL)	4	5	7.5	10	--	mL
Liquid 12.5 mg/1 teaspoon (tsp)	$\frac{3}{4}$	1	1 $\frac{1}{2}$	2	--	tsp
Chewable 12.5 mg	--	1	1 $\frac{1}{2}$	2	4	tablets
Tablets 25 mg	--	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2	tablets
Capsules 25 mg	--	--	--	1	2	caps

Límite de edad: Para alergias, no dar a niños menores de 1 año. Razón: puede causar que los bebés se pongan muy soñolientos. No darlo para el catarro a ninguna edad. Razón: no hay evidencia de algún beneficio. No darlo a niños menores de 4 años. Si tiene menos de 6 años, no mezclarlo con otros medicamentos.

Mida la dosis: Los goteros y jeringuillas son más exactos para medir. Si no tiene jeringuilla, puede comprar una en la farmacia y pedirle al farmacéutico que la enseñe a usarla. Trate de no usar cucharas de la casa. Mejor compre una cuchara de medir. Recuerde que 1 cucharadita (tsp) son 5mL y $\frac{1}{2}$ cucharadita son 2.5mL.

Cada cuánto: Puede darlo cada 6 horas cuando sea necesario.