



Cuidado después del tratamiento con Cantharidin

Para el tratamiento de Molluscum Contagiosum y Verrugas

1. Remueva el “tape” (si esta puesto) y luego lave el área con jabón y agua. **No deje el producto puesto por más de 4 horas después que fue aplicado en la oficina**
2. Si siente dolor, ardor o incomodidad, **favor remover el producto antes**
3. Luego de 24 horas, se va a formar una ampollita. El día después del tratamiento, esa ampollita va a crecer y a doler. Utilice algo frío y/o medicinas como Acetaminophen o Ibuprofen (Panadol o Advil) para el dolor cuando sea necesario.
4. **No remueva la ampollita.** De ser necesario, puede tomar una aguja, limpiarla con alcohol y hacerle un pequeño agujero encima de la ampolla. Luego, con las manos limpias, presione la ampolla hacia abajo.
5. Va a notar que se le van a hacer como unas bolsitas de agua y boquetitos pequeños que le van a durar como 4-5 días
6. Puede ponerle vaselina 2 veces al día hasta que se le sane en 5-10 días

Para las verrugas (siga leyendo si se le trató con Cantharidin para verrugas)

7. Después que se le sane, ponga ácido salicílico 17% (over-the-counter) una vez al día por 5-7 días si lo tolera. Esto es para prevenir que la verruga regrese por alrededor de donde se le puso el medicamento de Cantharidin
8. El área que fue tratada puede que le pique y se vea enrojecida. Llame a nuestra oficina si continúa sintiendo dolor o quemazón aún después que la ampollita se le haya vaciado.
9. ES MUY RARO pero hay personas que han tenido una reacción alérgica al medicamento de Cantharidin. Llame al 911 si nota que no puede respirar, se le hincha la cara y desarrolla urticaria.